

プロペシア®錠 の使用に関する同意

私は、男性型脱毛症に関する診断結果について説明を受け、併せてプロペシア錠®を使用することの意義および効果、副作用等についての説明を受けました。

説明内容、使用に関する異議はなく、プロペシア錠®を使用することに同意致します。

平成 年 月 日

● 氏 名

● 住 所

● 連絡先(携帯)

プロペシア®錠 の男性型脱毛症(AGA)への使用について

男性型脱毛症の治療のためのお薬であるプロペシア®錠は、日本においては2005年10月に厚生労働省より承認されています。

このお薬は保険診療の対象とならず、診療費ならびにお薬代は自己負担となります。

以下の説明をよくお読みいただき、このお薬を理解なさった上で、治療を受けることに同意される場合には、添付の同意書にご署名をお願い致します。

江崎外科内科 医師 江崎 哲史

【男性型脱毛症(AGA/エージーエー)とは】

男性型脱毛症(AGA)は、壮年性脱毛とも呼ばれ、思春期以降に額の生え際や頭頂部の髪が、どちらか一方あるいは両方から薄くなり、徐々に進行していく状態のことを言います。

たとえば円形脱毛症では、急激に脱毛が進行しますが、AGAでは徐々に進行していくのが特徴のひとつであり、額の生え際や頭頂部の髪の毛が細くなって、うぶ毛の様な十分に育たない髪の毛が多くなり、抜け毛が進行し頭皮が透けて見えるようになります。

親、兄弟、祖父母に脱毛症を認めることが多いのもAGAの特徴のひとつです。

【プロペシア®錠とは】

プロペシア®錠(一般名:フィナステリド)は、男性型脱毛症用薬という薬効に分類されます。

AGAの人の頭皮部分に多くあるとされる男性型脱毛症の原因物質である ジヒドロテストステロン(DHT)という物質が作られるのを抑えることで髪の毛の成長する周期を正常化し、抜け毛を抑えます。

(2012年1月1日現在、プロペシア®錠は世界60カ国以上で承認され使用されています。)

【予想される効果】

このお薬は、1日1回の内服を継続することでうす毛の進行を遅らせる効果が期待できる薬剤です。

通常、効果が確認できるまで6ヵ月間、毎日1回このお薬を飲み続ける必要があります。効果を継続させるためには継続的に服用することが大切です。

日本国内での48週間の臨床試験では、頭頂部の写真評価で半数以上の人に改善が認められています。なお、すべての患者様に効果があるわけではないことをご理解ください。

【可能性のある副作用】

薬は人によっては、目的の効果以外の望ましくない作用が出る場合もあります。

このお薬では、まれに食欲不振、全身倦怠感(肝機能障害)等の症状があらわれる可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに担当医師の診断を受けてください。

また、勃起力が弱くなったり、性欲減退や精液量の減少などの性機能に関する症状や、胃部不快感なども報告されています。副作用は人により程度が異なりますし、上記以外の副作用が発現する可能性もあります。服用後に何か気になる症状や気がかりなことがありましたら、すぐに担当医師または薬剤師にお申し出ください。詳しい症状をお聞きし、直ちに適切な処置を行います。

なお、副作用とは異なりますが、このお薬を服用中の患者様では、前立腺がん検査で測定されるPSA*という検査の値が約50%低下することが知られています。このことから、前立腺がん検査の際は測定したPSA濃度を2倍した値を目安として評価する必要があります。

このお薬を服用中に前立腺がんの検査を受診される場合には、検査を実施する医療機関の医師にこのお薬を服用していることをお知らせください。

*PSAは、Prostate Specific Antigen（前立腺特異抗原）のことで、前立腺から分泌される物質でセリンプロテアーゼ（セリン蛋白分解酵素）に分類されます。PSAは本来、前立腺から精漿中に分泌され精子が体内に放出される時に精漿中のゼリー化成分である蛋白を分解して精子の運動性を高める役割を果たします。したがって、健康男性であれば、血液中にPSAが浸出することは非常に稀です。しかし、前立腺に疾患があると血液中にもPSAが浸出し血液検査で測定が可能となります。

プロペシア®錠を服用中の方は献血ができません。

献血をする場合は、服用中止または終了後1ヵ月間空けてください。

また、このお薬は肝臓で代謝されます。使用中に肝臓の酵素が上昇した報告があります。

この薬を処方される前にすでに肝機能障害のある方は、担当医師にご相談ください。

【AGAに対する他の治療法の有無およびその内容】

AGA治療法には、プロペシア®錠を用いる飲み薬による治療の他に、塗り薬による治療があります。

医薬品として市販されている育毛剤としては、ミノキシジルや塩化カルプロニウムがあり、医療用医薬品としては5%塩化カルプロニウムがあります。

どの治療が適切で効果的であるかは、個々の患者様によっても異なると考えられますので、詳細については医師にご相談ください。

【プロペシア®錠の使用についての同意】

プロペシア®錠による治療を受けられるかどうかは患者様の自由意思によってご判断ください。

患者様からのご相談ならびに治療には最善を尽くします。

【患者様にお守りいただきたい事項】

プロペシア®錠を割って飲まないでください。

妊娠中の方がプロペシア®錠を服用したり、破損したプロペシア®錠に触れて有効成分が吸収されたりすると、男子胎児の生殖器官等の正常発育に影響を及ぼすおそれがあります。また、プロペシア®錠を割って服用した場合の安全性・有効性も保障されておりません。

治療の間は、医師の指示に従ってください。また、このお薬を服用開始後、治療を継続するか否かについては医師とよくご相談のうえお決めになって下さい。

なお、このお薬の服用後でも、何かわからないことやもっと知りたいこと、心配なことがありましたら、ご遠慮なく医師または薬剤師、看護師にご相談ください。

【診療費ならびに薬剤費】

このお薬は保険診療の対象となっていないので、診療費並びに薬剤費は全面患者様の自己負担となります。

【その他・人権保護に関して必要な事項】

このお薬が適正に使用され、よりよい治療が行われるために、患者様の診療記録を販売元の企業あるいは厚生労働省へ提出したり、医学雑誌に発表することがあります。ただし、いずれの場合であっても、個人保護に関する公的指針に準拠し、患者さまのプライバシーの保護には十分な配慮を致します。

以上